

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 23 - 7 - 70 079859

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C.C.P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 3 au Bulletin du mois de Juillet 1970

22 Juillet 1970

Avertissement

VIGNE

TORDEUSES DE LA GRAPPE (Cochylis - Eudémis)

Les papillons de la deuxième génération de Cochylis et d'Eudémis sont capturés en pièges alimentaires depuis une dizaine de jours. Les vols sont très variables d'une région à l'autre, mais les conditions climatiques dernières (pluies et nuits fraîches) sont à l'origine de l'irrégularité des captures, qui reflètent mal l'allure normale des vols dans le vignoble. Les attaques de Tordeuses de la première génération, parfois très importantes dans les parcelles non protégées, doivent nous inciter à la plus grande prudence.

La lutte contre cette deuxième génération de Cochylis et d'Eudémis doit être menée efficacement, afin de limiter les risques d'installation de la Pourriture grise (Botrytis).

Les viticulteurs ayant l'habitude d'utiliser des produits de type préventif, devraient intervenir dès réception de la présente Note.

Les traitements mettant en oeuvre des produits curatifs, seront à réaliser dans la période du 27 au 29 Juillet.

Dans les vignobles de CLEEBOURG, ce traitement devra être différé de 6 à 8 jours.

MILDIOU

Bien que l'état sanitaire du vignoble vis-à-vis du Mildiou soit satisfaisant, de nouvelles taches sont apparues localement dans la période du 16 au 18 Juillet. Nous conseillons de profiter du traitement contre les Tordeuses, pour renouveler la protection fongicide. Utiliser de préférence un produit jouissant d'une longue rémanence, tel que Cuivre ou Cupro-organique.

OIDIUM

Ajouter un anti-Oïdium à la bouillie Mildiou.

ARAIGNEES ROUGES

Il est actuellement trop tôt pour intervenir sur les générations estivales qui restent, jusqu'à présent, extrêmement limitées. Attendre un nouvel avis pour traiter.

Information

ARBRES FRUITIERS A NOYAU

- CERISIER -

ANTHRACNOSE DU CERISIER

Une nouvelle application fongicide est conseillée sur les variétés tardives. Intervenir immédiatement après la récolte. Avoir soin de protéger également les jeunes sujets en pépinières (consulter notre Note du 23 Juin).

ARBUSTES A PETITS FRUITS

- FRAMBOISIER -

DESSECHEMENT DES RAMEAUX (Didymella applanata)

La plupart des variétés arrivant en fin de récolte, renouveler le traitement contre cette maladie.

Il est recommandé de bien mouiller l'ensemble des pousses de l'année. Couper les pousses en voie de dessèchement et les détruire par le feu.

Avertissement

CULTURES MARAICHIERES

- TOMATE -

MILDIOU

Un traitement fongicide devra être exécuté dès réception, sur l'ensemble des cultures de plein champ.

Pour le choix du produit, se référer à la liste en votre possession (rubrique Mildiou de la pomme de terre).

GRANDES CULTURES

- POMMES DE TERRE -

MILDIOU

Le traitement recommandé dans notre Note du 17 Juillet devrait, si cela n'est déjà fait, être exécuté de toute urgence sur les variétés sensibles à cette maladie.

Information

TOUTES CULTURES

VERS GRIS

Des dégâts de Vers gris nous sont signalés sur diverses cultures, notamment sur maïs, betteraves et cultures maraîchères.

Bien que ces dégâts soient limités pour l'instant et causés par des populations indigènes, nous conseillons à nos abonnés de se reporter à notre Note du 17 Juin, afin d'être prêts à intervenir en cas de nécessité.

Le Responsable de la Station
D'Avertissements Agricoles :
C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.